

	Préconisations pré-analytique		Code: OG-PA-009
			Version: 01
			Page 1 sur 3
Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Annexe 2 : Examens et préconisation pré-analytique

Examens	Préconisations préanalytiques
Glycémie à jeun, Calcium, Folate et Vitamine B12.	8 heures de jeûne.
Bilan lipidique (Cholestérol, HDL, LDL, Triglycérides).	<u>12 heures de jeûne.</u>
EPP, Fer sérique, Mg, phosphate	De préférence à jeun.
Test à l'urée pour recherche d'helicobacter pylori	✓ 2 heures sans boire, ni manger ni fumer. ✓ Arrêt de tout traitement antibiotique au minimum 4 semaines avant le test. ✓ Arrêt des inhibiteurs de la pompe à protons au minimum 2 semaines avant le test. ✓ Arrêt des antiacides et pansements gastro-intestinaux 24 heures avant le test.
Dosage des médicaments	A prélever juste avant la prise du médicament selon les recommandations du clinicien.
Spermogramme	Abstinence sexuelle de 2 à 7 jours.
Scotch test anal	Au lever avant la toilette et les premières selles
ECBU	Miction du matin ou urine ayant séjourné au moins 3 à 4 heures dans la vessie. En dehors d'antibiothérapie. Noter les renseignements cliniques si le patient a uniquement .S il a en plus un bilan sanguin le préleveur se charge de noter les RC sur la tablette Identique pour le TT/ TSHe
Prélèvement vaginale	En dehors des périodes de règles et de traitement antibiotique et antifongique.
Prolactine	Repos 20 mn avant le prélèvement.
PTH	Analyser dans les 2H .

	Préconisations pré-analytique		Code: OG-PA-009
			Version: 01
			Page 2 sur 3
Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Examens	Préconisations préanalytiques
Cortisol	Cortisol du matin entre 8 et 10 H. Cortisol du soir entre 16H et 17 H. } <u>Repos non exigé</u>
Aldostérone et rénine	A jeun entre 8 H et 10 H du matin. Debout ou couché (prélèvement debout après 1H de marche ; prélèvement couché après 1H de décubitus).
HE4	CA125 est demandé conjointement avec HE4 : Ne pas saisir CA125 sur le SIL.
Dosage des médicaments	Juste avant la prise du médicament
Dérivés méthoxylés des catécholamines (sang)	Repos 20 mn à jeun Bon respect du régime alimentaire dans les 48h précédant le prélèvement : éviter les bananes, le chocolat, les tomates, les agrumes, la vanille) pour le prélèvement sanguin. Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé. Urine pas de régime
ACTH	Prélèvement entre 7 H et 10 H du matin. L'analyse est signalée immédiatement aux techniciens. NB : Tube EDTA préalablement refroidis
DPNI	Jeûne non obligatoire mais souhaitable. Bon de demande et consentement dûment remplis.
TP	Noter la dose si le patient est sous Sintrom

	Préconisations pré-analytique		Code: OG-PA-009
			Version: 01
			Page 3 sur 3
Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Examens	Préconisations préanalytiques
Dépistage de trisomie 21	✓ 1^{er} trimestre : Entre 11 et 13 semaines 6 jours d'aménorrhée. ✓ 2^{ème} trimestre : Entre 14 et 17 semaines 6 jours d'aménorrhée. Vérifier : ✓ Date de naissance. ✓ DDR (facultative). ✓ DDG. ✓ Poids de la patiente. ✓ LCC et CN avec la date d'échographie correspondante. ✓ Nombre de fœtus. Antécédent de T21, tabac et diabète si possible.
TSH	● A jeun (de préférence) ● Avant 12h (sauf confirmation par le médecin) article*
Test synacthène	Cortisol à 8h, injection IM du synacthène puis cortisol après 1 heure de l'injection.
Test de freinage (Dexamethasone)	Prise de 2 comprimés de Dexaméthasone le soir à 23h fournis par le laboratoire Cortisol à 8h.